

NOM	Puccinia annularis (F. Strauss) G. Winter 1813	
Synonymes	P. scorodoniae Link. 1825	
Hôte	<i>Teucrium scorodonia</i> L. (Germandrée commune, Sauge des bois, Fausse menthe, Germandrée à odeur d'ail)	
stade 0 ou S	spermogonies	
	spermaties	
stade I	écidies	
	écidiospores	
stade II	urédies (sores)	
	urédospores	
stade III	téleutospores	Sores foliicoles, compacts, non déformants ; seul stade connu
Récoltes :	Sclaigneaux (B-5300), 25/09/2005 leg. Daniel DESCHUYTENEER	



Détail de la feuille (photo UCL)




Détail de la fleur (photo UCL)



Taches sur les feuilles indiquant la présence de sores à la face inférieure




Sores à téléutospores, foliicoles, roux à brunâtre clair, compacts et non pulvérulents



Téleutospores colorées au bleu coton



Téleutospores observées dans l'eau



Téleutospores colorées au rouge Congo



Téleutospores colorées au Melzer + hyphes génératrices



Téleutospores colorées au Melzer



Détail de téléutospore colorée au BCoton

Toutes les photos (sauf 1 et 2, site de l'UCL) ont été réalisées par Daniel DESCHUYTENEER